

# Očkovací kalendář pro dospělé - podle věku





Nemoc	Věková kategorie					Přeočkování	Poznámka
	18–26 let	27–49 let	50–59 let	60–64 let	65+ let		
<b>Tetanus</b>	booster po 10–15 letech		booster po 10 letech			po 10–15 letech	očkovaní také v rámci úrazů a poranění
<b>Pertuse</b>	minimálně 1 dávka 1× za život					po 10–15 letech	zejména rodinné kontakty dětí do 1 roku věku, těhotné ženy, možné v rámci očkování proti tetanu
<b>Varicella</b>	2 dávky					nestanoveno	pro vnímavé (bez historie nemoci nebo séronegativní) + práce v riziku + rizikové skupiny
<b>VHA</b>	2 dávky					nestanoveno	pro vnímavé a neočkované v dětství + práce v riziku + rizikové chování; možné aplikovat kombinovanou VHA/VHB vakcínu
<b>VHB</b>	3 dávky					nestanoveno	pro vnímavé a neočkované v dětství + rizikové skupiny + rizikové chování; možné aplikovat kombinovanou VHA/VHB vakcínu
<b>HPV</b>	3 dávky					nestanoveno	pro ženy i muže neočkované v dětství
<b>Herpes zoster</b>			1 - 2 dávky dle použité vakcíny			nestanoveno	očkovaní se doporučuje zahájit co nejdříve
<b>Klíšťová encefalitida</b>	3 dávky, první přeočkování po 3 letech, další po 5 letech		3 dávky, přeočkování po 3 letech			po 3–5 letech, max. po 10 letech	rizikové skupiny + práce v riziku;
<b>Pneumokokové nákazy</b>	1 dávka PCV nebo PPV		1 dávka PPV nebo PCV	1 dávka PCV + 1 dávka PPV23		PPV: po 5 letech pouze 1 x	osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory + osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem s chronickým nespecifickým onemocněním + u jedinců po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) + osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity
<b>Meningokokové nákazy</b>	2 dávky MenB, 1 - 2 dávky Men A, C, W, Y					podle SPC vakcíny	rizikové skupiny + práce v riziku + cestovatelé + osoby v ohnisku IMO + osoby se zdravotní indikací; přeočkování pouze pro osoby s přetrvávajícím rizikem infekce
<b>Chřipka</b>	1 dávka					každoročně	očkovaní se týká zdravých osob + osoby s rizikovými faktory + práce v riziku
<b>Hib</b>	1 dávka					nestanoveno	rizikové skupiny
<b>Vzteklina</b>	5 dávek postexpozičně / 3 dávky preexpozičně					po 2–5 letech pouze při práci v riziku	cestovatelé, rizikové skupiny (např. speleologové), práce v riziku
<b>Spalničky</b>	1 dávka					nestanoveno	zdravotníci dle legislativy, cestovatelé

## Vysvětlivky:

**MenB** meningokoková vakcína proti séro skupině B  
**Men A, C, W, Y** meningokoková konjugovaná tetravalentní vakcína proti séro skupině A, C, W, Y  
**PCV** pneumokoková konjugovaná vakcína  
**PPV** pneumokoková polysacharidová vakcína

**VHA** virová hepatitida typu A  
**VHB** virová hepatitida typu B  
**Hib** Haemophilus influenzae typ b  
**HPV** lidský papillomavirus

 **doporučeno všem dané věkové kategorie**  
 **doporučeno v případě rizikových faktorů**